

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

RACHITIDE.

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

RACHITIDE.

DISPUTATIO MEDICA  
INAUGURALIS,

D'E

RACHITIDE;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu, et  
Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

JOANNES CHEYNE,

SCOTO-BRITANNUS.

---

*Hei mihi! ——— quantum mutatus ab illo!* VIRG.

---

Ad diem 24. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBAT ADAMUS NEILL CUM SOCIIS.

---

M DCC XCV.



JACOBO THOMSON

DE

BOGIE

ARMIGERO;

VIRO

INTEGERRIMO;

OB

AMICITIAM,

ET

COLLATA

IN

ILLUM

BENEFICIA,

HAS

STUDIORUM

PRIMITIAS

D. D. CQUE.

JOANNES CHEYNE.

JACOB THOMSON

BY

BOOIE

AMERICAN

VIRG

INTELLIGENCE

OR

AMERICAN

BY

COLLATA

IN

THE

REPUBLIC

AND

STUDY

TRIMBLE

D. D. COE

JOHN W. CHERRY

SC

CORRIGENDA.

Pag. 10. lin. 2. *pro qud lege quòd*

— 17. — 8. *pro ubi lege aut*





DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

RACHITIDE.

---

§ I. **N**IHIL in medicina inutilius est, nihil magis infructuosum, quàm vana de morborum origine certamina inire. Hæc, quod medicinæ faustum felixque fit, monente meliora APOLLINE, nunc mittuntur, neque, ut speramus, in posterum recrudescant. Non enim certando, disputando, altercandove, sed  
A periclitando

periclitando et observando excolenda medicina est.

II. Quo tempore, in EUROPA, primùm apparuit *rachitis*, de eo, in contrarias partes, disputatum est. Affirmant hi medici, vix ampliùs ducentis abhinc annis, enatam esse : dum asserunt illi, veteribus familiarem fuisse ; neque alios, profectò, *valgos* et *varos* ROMANORUM, quàm miseros, quos, primâ ætatulâ, deformaverat.

III. Qui primam (II.) opinionem acceperunt, ii censent *rachitidem* ortam esse *lue venerea* ; morbo fœdo, qui, centum ferè antè annis, ab AMERICA in EUROPAM navibus tranfvectus erat.

IV. Verùm, etiãmsi concederetur, *rachitidem* aliquantò pòst enatam esse, quàm trajecta erat *lues venerea* ; tamen, hoc concessò, minimè fas est concludere, illam ex hac originem deduxisse.

deduxisse. Valgi enim, ut fert sagax CULLENUS, varique, fanis, ut videtur, parentibus enascuntur; et parentibus *lue venerea* inquinatis, quod ad formam, fani: adeo profectò sæpe, ut, deductis etiam patribus dubiis, non fit, quamobrem iis, qui opinantur *rachitidem lue venerea* esse genitam, assentiamur.

## DEFINITIO.

V. Notæ, quibus *rachitidem* definivit CULLENUS, hæ sunt:

“ Caput magnum anteriùs maximè tumens;  
 “ genicula tumida; costæ depressæ; abdomen tumidum; cætera marcescentia\*.”

## REGIO,

\* Vid. CULLEN, *Synops. Nosolog. Meth. Gen.* LXXXIII.

## REGIO, ÆTAS.

VI. *Regio.*—*Rachitide* deformantur infantes in iis potissimum regionibus, quarum incolæ partim luxuriosè vivunt, partim sedentariis artificiis occupantur. Quocirca, per totam ferè EUROPAM, nota est; præcipuè autem in urbibus, ubi vivunt opulenti, et artes utilitatis, elegantiae, et luxuriæ ministratrices, manu fiunt.

VII. *Ætas,*—qua *rachitidi* opportuni sunt infantes, arctis enimvero finibus circumscribitur. Rarè enim, sextum ante mensem, aut secundum post annum, incipit. Interdum verò hos fines utrinque transgressa, petit infantes modò nondum semestres, modò jampridem bimulos; quinimo, ni aut fallant medici aut ipsi fallantur, enati sunt infantes eâ deformes.

SIGNA.

## SIGNA.

VIII. *Rachitis* vel *incipiens* habenda est, cùm indubiis nondum signis se prodiderit; vel *firmata*, cùm sic jam increverit, ut propriis sibi notis insigniatur.

IX. *Incipiente rachitide*, macrescunt musculi; flaccescit cutis; pallefcit vel potiùs flavescit facies; totum simul corpus languescit, labascit; dum nihildum febrit æger, necdum tumescunt artus, aut marcescit stomachus.

X. Nisi opportunè consistit hic morbus et inclinatur, alia, et pejora quidem, deinceps mala jam (IX.) dictis accedunt. Augescit caput; sternum sic protruditur depresso costis, ut pectus a parte anteriore aspicienti carinatum appareat; spina dorfi, et ubique corporis ossa, tumescentibus jam artibus, huc illuc, incurvescunt;

vescunt; et, ne longum faciam, totus homunculus, miserum in modum, distorquetur.

XI. Cùm eò deformitatis perventum est, æger miserandus febricitat, et ægrè spirat; alvus fluit; appetitus deficit; haud rarò etiam diurus gravat hydrops; et tandem motionis omnino impos æger, et ad ossa cutemque maceratus, fato concedit.

XII. Non autem semper, hoc (IX.—XI.) ordinè, signa, aliis deinceps alia, superveniunt. Morbo enim constat non facies una; neque, profectò, rarò, ordine tanquam retroactò, initio apparent gravissima signa.

XIII. Miserandi homunciones, qui *rachitide* deformantur, plerumque acris, pro ætate, imo præcocis ingenii sunt; tanquam si natura tanto pulchrioribus mentem virtutibus ornaret, quanto magis dehonestat corpus. For-  
san verò hæc infolita ingenii maturitas, curæ  
magis,

magis, qua ægri animum oblectare certant miserantes amici, tribuenda est, quàm benignitati naturæ.

XIV. Non verò semper præcoce sic ingenio sunt infantes, quos *rachitis* deformat. Interdum enim, tanquam si, ex corporis vitio, mens quòque imbecillitatem caperet, mori sunt et fatui.

## EXTISPICIUM.

XV. Quoniam, patefactis ferro cadaveribus, variis in conspectum veniunt varia ; hęc ea tantummodo, quæ frequentissimè apparent, et optimè, quæ sit morbi natura, ostendunt, recensere nobis in animo est.

XVI. Musculi neque solitam, quam in omnibus ferè aliis cadaveribus, rigiditatem habent, neque, profectò, colorem : cerebrum  
flaccidum

flaccidum est, et ejus ventriculi per sæpe aquâ oppleti: pulmones *pleuræ* adhærent, et inflammationis vestigia ostendunt: hepar et splen tument et obcallent; in thorace et abdomine aqua est; præterea, intestina sunt solito crassiora, et flatu distenta, atque glandulæ *mesenterii* tumidæ sunt, et induratæ: ossa, denique, adeo mollia sunt, ut scalpello haud ægrè queant secari.

#### CAUSA PROXIMA.

XVII. Deficiens in sanguine materia, ex qua ossa formentur, a multis, imprimis CULLENO, proxima *rachitidis* causa habita est; et, profectò, si in mollitie ossium omnino confisteret hic morbus, nihil, forsitan, esset, quare iis, hac de re, non assentiremus.

XVIII. Cùm verò perpauci sint morbi, qui æquè, ac *rachitis*, totum corpus labefaciunt,

talem



talem opinionem accipere non possumus. Licet enim defectu materiæ, qua appositâ durefcant ossa, hæc mollescant et declinent; tamen explicari non potest, quare eâdem causâ ipsi quoque muscoli macescerent flaccescerentque.

XIX. Hanc (xviii.) ob rem, illâ (xvii.) opinione rejectâ, multo nobis verifimilius videtur, proximam *rachitidis* causam esse sanguinem, vel alimento deficiente inconfectove, vel *chylo* deficiente aut non satis in fluidum animale subactò, magis solito tenuem et dissolubilem. Sanguine enim sic dissoluto, facilius est exponere, quare non solum ossa, sed ipsi etiam muscoli, vitientur.

XX. Talem *rachiticorum* esse sanguinem, eò probabile redditur, quòd, incisis cadaveribus, glandulæ, eæ in primis mesenterii, quæ ad *chylum* sic subigendum, ut in bonum postea sanguinem mutetur, prorsus necessariæ sunt,

tumidæ sic et induratæ, ut proprio munere nequeant perfungi, conspiciuntur ; quæ ipsa fluida aquata adeo sunt et diluta, ut neutiquam mirum sit, musculos, post mortem, non, ut post alios plerisque morbos solent, frigore rigere ; demumque, quòd cava semper plus aquæ minusve continent.

XXI. His (xx.) cognitiss, liceat nobis concludere, causam, quæ rectè *rachitis* exoritur, esse sanguinis tenuitatem ; quam partim, ut putat CULLENUS, laxitas et debilitas fibrarum motricum, quarum est ingesta alimenta concoquere, et *chylum* hinc paratum in vivum ritè mutare sanguinem, forsàn effecerint.

#### CAUSÆ REMOTÆ.

XXII. Remotiores *rachitidis* causæ partim ad constitutionem parentum respiciunt, partim ad ipsius infantis educationem.

XXIII.

XXIII. *Constitutio parentum.*—Ii, præ cæteris, infantes *rachitidi* obnoxii sunt, quorum parentes aut otio, voluptatibus, et luxuria diffluunt; aut necessariis quibusdam artificiis, quibus infirmatur corpus humanum, versantur; aut, demum, ob inconcessum concubitus, *lue venerea* graviter plexi sunt.

XXIV. Hujusmodi (XXIII.) profectò parentes, infirmam et morbosam ferè prolem gignunt. Experienciâ autem constat, infontem, ob parentum vitia, rarè *rachitide* plecti sobolem. Hæc, enimvero, nihilo fortasse infantilem prolem huic morbo opportuniorem reddunt, nisi quatenus alant hæreditaria morborum femina; quæ, obcæcata quasi in præsentia, parentibus infidiosè latent, ut postea in prole revirescant.

XXV. Horum feminum, id, unde scrofula enascitur, plurimùm, ad tenera infantum corpora *rachitidi* obnoxia reddendum, pollere videtur. Inclinant animi, ut ita credamus; eò quòd utrique morbi partes glandulosas petunt; utrique eadem curatione sanantur, eadem ingravescent. Quinetiam, nunquam nobismetipsis contigit deformatum *rachitide* infantem videre, in quo ipso, vel in cujus alterutroque parente, nonnulla scrofulæ vestigia non apparebant.

XXVI. Hæc (xxv.) opinio haudquam infirmaretur, etiamsi nobis objiceret aliquis, deformatos *rachitide* infantes parentibus, quos nunquam dehonestaverit scrofula, enatos esse; cùm præsertim, id profectò quod ab omnibus conceditur, hujus femina, per plures deinceps soboles, inobservata lateant.

XXVII.

XXVII. Nedum eandem opinionem multum dilueret is, qui nobis monstraret sanos liberos, quos procreaverint glandulofi parentes; propterea quod, ut inter omnes convenit, interdum providâ obstari potest curâ, quò minùs insita et scrofulæ et *rachitidis* femina vigescant. Quinetiam, si nihilominus perneget aliquis, scrofulam et *rachitidem* cognatos morbos esse; saltem concedendum est, utraque simul eandem sæpe familiam fœdare.

XXVIII. His (xxv.—xxvii.) attentè consideratis, potest, ut nobis videtur, cogi et effici, *rachitidem* ex scrofula, si ex ullo parentum morbo, enasci.

XXIX. *Infantum educatio.*—Quæcunque infantum corpus multum debilitant, *rachitidi* occasionem præbent: potissimum enim infantes, aliquà infirmati, membrorum distortionè et pravitate deformantur.

XXX. Ad hoc genus (xxix.) causarum pertinent alimentum non satis nutriens, quod, ut suprà (xix.) diximus, sanguinem jùsto dilutiorem reddit; magnum sive alvi, sive sanguinis, profluvium; prægressi demum morbi, *variola*, scilicet, *rubeola*, aliive quibus opportuna est infantilis ætas.

XXXI. His (xxx.) accedant quies nimia, aër infalubris, et immunditia. Hæc enim omnia permultùm utique obstant, quò minùs infantum corpora fiant compacta et robusta; et, in urbibus populo frequentibus, cum parca nimis parùmve nutriente diæta, ad pravitatem membrorum efficiendam conspirant.

XXXII. Ad alimentum non satis nutriens pertinent, quorundam opinione, farracea, quæ nondum fermentata sint; opinione autem omnium, lac jùsto dilutius.

XXXIII.

XXXIII. Farracea (xxxii.) nondum fermentata committere, ut mollescant et distorqueantur ossa, neutiquam verisimile videtur; propterea quòd, ubique terrarum, quoad scimus, infantes hujusmodi nutrimento, magna ex parte, aluntur, neque eò tamen magis membris deformes sunt. Hanc ob rem, apud omnes ferè medicos peritos, et, quid verum sit, quid non, experientiâ doctos, propè jam est, ut hæc opinio, utpote rebus veris haudquaquam innitens, profùs exolescat.

XXXIV. Lac verò dilutius efficere, ut perinfignes membrorum depravatione fiant infantes, vero, ut nobis videtur, multo magis consentaneum est. Propter lactis enim tenuitatem, proletariorum, præ cæteris, infantes, qui, per duodecim, imo octodecim haud rarò, menses, pannosis matrum mammis potissimum aluntur, sæpe *rachitide* deformes sunt. Eadem de causa, interdum distorquentur opulentorum

rum

rum etiam infantes, qui mercenariis aluntur  
nutricibus, quæ nimis diu lactant, quarum-  
ve cibus parùm lactescit.

### PROGNOSIS.

XXXV. Ex hoc morbo forma, potiùs  
quàm vita, in periculo versatur. Cùm ita sit,  
deformitas magis, quàm mors, timenda est.

XXXVI. 1. Si morbus gravis accesserit,  
et pòst paulò pejora (x.) signa apparuerint,  
est utique malum. Tum enim timendum est,  
ne homunculus insigniter deformetur. Quin-  
imo, tantâ sævitiâ morbi haud rarò de vita de-  
cedit: neque, profectò, hoc mirum est; cùm  
præsertim, magno ossium deflexu thorax adeo  
coangustetur, ut pulmones proprium sibi vi-  
tale munus nequeant absolvere.



2. Malum itidem est, quoties *rachitis* infantes nondum semestres, insigniterve jam infirmatos invadit. Tum enim exercitatio et medicamenta, quæ ejus incremento obfistant, non possunt adhiberi; et sic miseri pereunt morbo, quo firmiores plerumque formâ tantùm plectuntur.

XXXVII. I. Sin, ubi incuriâ parentum, diætâve pravâ, concitata fuerit *rachitis*, aut prægressis, qui vires nondum magnopere labefactaverint, morbis supervenerit; tum educatione aptiore, simulque medicamentis, ex iis quæ corpus firmant, plerumque, ne magis increfcat, obstari potest.

2. Quòd si, etiam rebus ita se habentibus, parentum alterutriusque intus scrofulam prodant evidentes cicatrices; futura, utrùm bonam in partem inclinent, an in malam, enimvero incerta sunt.

## C U R A T I O.

XXXVIII. Medicum, cui curæ fit *rachitidem* curare, oportet incipientem, five veteratam, quàm primùm sistere; et simul, ne deformetur corpus, quantum potest obstare.

## C O N S I L I U M P R I M U M.

XXXIX. Quò sistatur morbus, vigor marcescenti homunculo restituendus est, iis quæ firmant et roborant. Ad hoc genus pertinent idoneum regimen et apta medicina; de quibus, profectò, speciatiim nobis uberiùs disputandum est.

XL. *Regimen*—suo complexu continet diætã, exercitationem, et lavationem frigidam. De his igitur, deinceps, pauca dicenda sunt.

XLI.

XLI. *Diæta* partim solidâ materiâ constat, partim liquidâ. Illi *cibus* nomen est; huic *potus*.

I. A. *Cibus* debet, aliqua ex parte, constare ex pane farreo. Fermentatus, si commodè comparari potest, ei non fermentato anteferendus est; propterea quòd faciliùs fortasse concoquitur. Verùm, etiam pane non fermentato corpus humanum bene nutriri, procul est, ut aliquis negare possit. Torosa enim juventute SCOTIA gaudet; neque ullâ milites laboris, inediæ, et algoris tolerantiores, magisve bello invictos, aut genuit aut aluit Mavor-tia tellus.

B. Carnes quoque tenerarum animantium temperanter assumere liceat; vel, quod utique melius est, juscula, quibus eadem coctæ sunt.

2. A. *Potus* optimus, dummodo fit ventriculo idoneum, lac vaccinum est. Quòd si alienum fit, aliud, quod magis conveniat; ejus vice bibendum est; imprimis dilutum aquâ vinum quodlibet austerum, quod, etiam stomacho non marcescente, interdum anteferendum est, præsertim sub finem morbi, ubi haud rarò soluta alvus est. Etiam perfusum diluto sic vino panem edere, haud alienum est.

B. *Cerevisiæ*, ut ferunt nonnulli, iis, qui hoc morbo implicantur, perutiles sunt. Nostra verò opinione, melius est ab iis omnino abstinere; partim quia ventriculum inflant, et partim quia liquatam sæpe jam nimis liquant alyum.

XLII. *Exercitatio*.—I. Incunte morbo, exercitandum sub dio corpus est, sive ambulationiuncula, sive gestatione; neque, profectò, multum interest, vehiculone gestetur, an hilarula et indefessa nutrice.

2. A. Inveterato autem morbo, ubi homunculus vel ipse, ob debilitatem, motûs imposfit, vel, ob ceream ossium mollitiem, nequit, absque flexura membrorum, moveri, corpus non sic exercitari potest. Quoties ita est, oportet laneis, vel strigili, vel nudâ manu leni quovis unguento lubricâ, corpus subinde acriterque perfricari.

B. In aquilonalibus SCOTIÆ regionibus, mos est oleo, ex squati hepate parato, genua aliosve artus, contra membrorum flexuras, manu identidem, neque, ut ferunt, frustra, fricare. Verùm, utrùm ita, ut aiunt, proficiat, necne, ex propria experientia, quippe quæ nulla fit, affirmare non possumus.

XLIII. I. *Frigidarium*—longè plurimùm, contra *rachitidem*, pollet. Non solum enim corpus firmat; sed etiam utile est ad munditiam, cujus rationem habere, imprimis necessarium est. Quantùm proficiat frigidarium, optimè

optimè eò cognoscitur, quòd, ex quo tempore inolevit mos infantes, quotquot eunt dies, aquâ frigidâ lavandi, membrorum pravitas rarior evasit.

2. Contrâ autem dixerunt nonnulli, non adeo proficere; idcirco quòd imbecilli in aquam frigidam tutò immergi, vel etiam hac lavari, non possunt. Replicari verò potest, paucos, perpaucos quidem, esse infantes, quin tutò sic aquâ frigidâ perfundantur; dummodo provideant matres aut nutrices, ne quid hinc postea detrimenti capiant. Hunc in finem, infantes, simul atque fatis perfusi fuerint, laneis ficcari, perfricari, et operiri quidem oportet.

XLIV. *Medicina*—quoque in auxilium, contra hunc morbum, vocari solet. Quæ autem medicamenta subsidium pollicentur, ea sunt, quæ deplent et roborant. De utroque genere pauca dicenda sunt.

XLV. *Primo genere*—continentur ea, quæ vomitum et alvum movent, et fonticuli.

XLVI. *Vomitoria*.—Quoties fœtor animæ, malacia, lassitudo, cruditas, hisque confimilia, ventriculum marcescere, neque assumpta alimenta bene concoquere ostendunt; lenis vomitio cienda est, ut, quæ intus offendant, rejiciantur, et firmetur fastidiosus ventriculus. Hoc consilio, primo quoque tempore, paucula *ipecacuanæ* grana devoranda sunt.

XLVII. *Cathartica*.—Si alvus, ut interdum initio morbi accidit, fœcibus oppleatur, vel, ut plerumque est per totum morbum, contento aëre distendatur, idoneis movenda est medicamentis. Hoc consilio, optima sunt ea, quæ, radix velut Pontica, dum deplent, intestina non infirmant. Hoc medicamentum non solum fœcibus intestina vacuefacit, et sic appetitum movet; sed etiam, ventriculum confirmando,

confirmando, concoctionem insigniter adjuvat.

XLVIII. *Fonticulos*,—ex quibus tenuiores partes sanguinis effluerent, facere olim mos erat. Cùm verò eorum usum plerique nunc medici aspernentur, eos, hìc loci, fusiùs tractare non opus est.

XLIX. *Genus* (XLIV.) *secundum*—complectitur præparata ex quibusdam metallis, et ex iis quæ terrâ pariuntur.

L. *Metallorum* nullum, contra *rachitidem*, tantùm potest, quantùm ferrum, variaque ex hoc præparata. Licèt hoc metallum multimodis assumi possit, commodissimum tamen est, levissimum pulverem, in quem ejusamenta redacta sunt, cum aromatum quibusdam, casia velut cortice, commixtum adhibere. Hunc pulverem unà cum testaceis itidem prod-  
esse



esse accepimus; et profectò, nihil videtur, quòd non identidem tentetur.

LI. Alia metalla, cuprum velut, quippe ex quorum usu detrimentum interdum capiatur, nunquam, nisi omnia jam tentata spem fefellerint, contra *rachitidem* adhiberi debent; eòque minùs, quòd ferrum, ex quo nihil timendum est mali, fortasse haud minùs pollet.

LII. *Roborantia terrâ enata*, contra *rachitidem*, multùm potuisse dicitur. Eorum verò efficacissima quidem tentata, plerumque ad spem non responderunt. *Cinchonam* enim ipsam, multiformiter et uberrimè quidem assumptam, parùm profecisse, periculo comperitum est.

LIII. His (xxxix.—LII.) dictis de primò (xxxviii.) consilio, proximum est, ut de secundo pauca dicamus.

## CONSILIUM SECUNDUM.

LIV. Hoc quoque consilio, æger regimine suprâ (XL.—XLIII.) fusiùs memorato roborandus est. Viribus enim nihildum redintegratiss, omnia, quibus, ne deformetur corpus, obstare conamur, parùm proficient.

LV. Ossium flexuræ sunt, quoad potest, chirurgia curandæ. Verùm, nisi incipienti deflexui opportunè obstitatur, parùm futura valebunt chirurgi conamina; siquidem ossa jampridem deflexa et distorta, nulla iterum arte in rectum queant reflecti.

LVI. Obstari quidem potest interdum, ne ossa, spina imprimis et tali, pravè jam detorta, pejùs deflectantur.

1. Deflexâ spinâ, optimum factu est, aptis quibusdam instrumentis caput et humeros quoque sic suffulcire, ut subjectus his truncus pondere nihil ferè omnino gravetur. Accommodatius nihil novi, quo hoc fieri possit, quàm machinam, quam nescio quis JONES aut fabricatus est, aut in melius mutavit.

2. Si tali pravitatem ceperint, tum unguento quovis emolliente priùs illiti, ocreis, quibus, in contrariam ei, ex qua declinaverint, partem, leniter et continenter inclinentur, comprimendi sunt.

## PROPHYLAXIS.

LVII. Curatione *rachitidis*, pro nostra facultate, absolutâ, nunc tantùm restat, ut per-

pauca

pauca dicamus de iis, quibus efficacissimè ab infantibus arceatur.

LVIII. *Vestitus*,—hoc confilio, mundus et ficcus debet esse, et, insuper, is, qui summæ cutis halitum et sudorem absorbeat. Hunc in finem, lanæ linteis anteferenda sunt vestimenta, imprimis hieme.

LIX. *Regio*,—si locum, quo educetur infantilis proles, eligere parentes patiatur res familiaris, montosa debet esse, et ea, qua aër salubris fit.

LX. *Exercitationem*—talem esse oportet, qualis infantem non fatiget, et semper sub Jove frigido.

LXI. *Lavatio frigida*—quotidie adhibenda est.

LXII. 1. *Diæta*—ea debet esse, quæ concoctu facilis sit, et satis nutriat.

2. Cùm diæta, maxima ex parte, lacte confectet, idcirco, ut ait HOMIUS, “ eligenda est  
“ nutrix sana; dentes et pulmones integros  
“ habens; gracilis, potiùs quàm obesa; hilaris;  
“ ris; non primipara, neque ebrietati, iracundiaë,  
“ aut Veneri dedita; lac subdulce,  
“ inodorum, albidum, non nimis vetustum,  
“ neque nimis tenue aut viscidum secernens.”

*Princip. Med.*

FINIS.

LXII. Diata — en debet esse, parte con-  
coctu facilis sit, et lacte nutrita.

2. Cuius diata, maxime ex parte, lacte con-  
fer, iactura, ut ait Horvathus, " exigenda est  
" matris lacte; dentes et pulmones integros  
" habere; gratia; potius quam obela; hila-  
" ris; non pumiparis, neque ebrietati, ira-  
" crandis, aut Venari debita; hoc subdole,  
" inobediens, albidum, non nimis vestitum,  
" neque nimis tenuis aut viciatum serpens."  
Parsip. Med. etc. etc. etc.

LXIII. Diata — en debet esse, parte con-  
coctu facilis sit, et lacte nutrita.

LXIV. Diata — en debet esse, parte con-  
coctu facilis sit, et lacte nutrita.



